

## კიბრის წამლობის ზოგადი სქემა

	განვითარების სტადია (წამლობის ჩატარების პერიოდი)	მავნე ობიექტი (დაავადებაები, მავნეალები)	პასტიცილის ტიპი	პასტიცილი (საგაჭრო დასახელება)	13ა-ზე საჭირო პრაქტიკის რაოდენობა
<b>ჩიტილების წამლობა გადარგვამდე</b>					
I	დათესვამდე ან დათესვის შემდეგ	ფესვის სიღამპლევები	ფუნგიციდი	პრევიკურ® ენერჯი	ჩიტილების მორწყვა 3 მლ. 2 ლ. წყალში 1 კვ.მ-ზე
II	აღმოცენებიდან 7-10	ფესვის სიღამპლევები	ფუნგიციდი	პრევიკურ® ენერჯი	ჩიტილების მორწყვა 3 მლ. 2 ლ. წყალში 1 კვ.მ-ზე
III	შენამვლა გადარგვამდე (2-3 ნამდვილი ფოთლის ფაზა)	ჩიტილების ჩანოლა, ბაქტერიული დაავადებები ხვატარი, ბუგრი, თრიფსი და სხვ.	ფუნგიციდი ინსექტიციდი	კუპერვალი® კონფიდორ® მაქსი	5 კვ. 50 გრ.
<b>წამლობა გადარგვის შემდეგ</b>					
IV	გადარგვიდან 7-10 დღის შემდეგ ან ღია გრუნტში თესვისას 1-2 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ასკოქიტოზი და სხვ.	ფუნგიციდი	ანტრაკოლი®	1.5 კვ.
		ხვატარი, ბაღის ბუგრი, თრიფსი და სხვ.	ინსექტიციდი	პრევიკურ® ენერჯი კონფიდორ® მაქსი	2.5 ლ. 50 გრ.
V	5-7 ფოთლის ფაზა	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ლაქიანობა, ალტერნარიოზი და სხვ. ნაცარი	ფუნგიციდი	არმეთილი®	2.5 კვ.
		ბუგრები, თრიფსები, ხვატარი და სხვ.	ინსექტიციდი	ნატივოლ®	0.4 კვ.
VI	ყვავილების გამოჩენა	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ალტერნარიოზი	ფუნგიციდი	კონფიდორი®	0.25 ლ.
		ნაცარი	ფუნგიციდი	მელოდი® დუო	2.5 კვ.
		ტკიპები	აკარიციდი	ნატივოლ®	0.4 კვ.
VII	ნაყოფების წარმოქმნა	ბუგრები, ხვატარი, ჩრჩილი, თრიფსები და სხვ.	ინსექტიციდი	ობერონი®	0.6 ლ.
		ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ლაქიანობა, ალტერნარიოზი და სხვ.	ფუნგიციდი	დეცის® პროფი	0.04 კვ.
		ნაცარი	ფუნგიციდი	არმეთილი®	2.5 კვ.
		ტკიპები	ფუნგიციდი	ნატივოლ®	0.4 კვ.
VIII	ნაყოფების ზრდა	ბუგრები, ხვატარი, ჩრჩილი, თრიფსები და სხვ.	ინსექტიციდი	ობერონი®	0.6 ლ.
		ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ლაქიანობა, ალტერნარიოზი და სხვ.	ფუნგიციდი	კონფიდორ® მაქსი	0.05 კვ.
		ნაცარი	ფუნგიციდი	კონსენტო®	2 ლ.
IX	ნაყოფების კრეფის დაწყება	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ალტერნარიოზი, ასკოქიტოზი	ფუნგიციდი	სულფოლაკი	3 კვ.
		ნაცარი	ფუნგიციდი	კუპერვალი®	5 კვ.
X	კრეფის პერიოდი	ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ალტერნარიოზი, ასკოქიტოზი	ფუნგიციდი	სულფოლაკი®	3 კვ.
		ნაცარი	ფუნგიციდი	იროკოლ®	4 კვ.
<b>სარეველების წინააღმდეგ</b>					
	გადარგვამდე 10-15 დღით ადრე	ვეგეტაციაში მყოფი სარეველები	ჰერბიციდი	რუმბო®	4 ლ.
	სარეველების განვითარების მიხედვით	ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი სარეველები	ჰერბიციდი	პანტერა 40 ეკ®	1.5 ლ.

**შენიშვნა:** მოცემული სქემა წარმოადგენს რეკომენდაციას და ამიწვლის პირობებიდან გამომდინარე შესაძლოა შეიცვალოს, კარგოდ გადანაცვლდეს წამლობის თანმიმდევრობა, გაიზარდოს ან შემცირდეს პერიოდები