

თხილის დასვის სქემა

განვითარების სტადია (წაგლოვის ჩაბარების პერიოდი)	გაჰვეა ობიექტი (დაბავადებაში, გაჰვეაბლაში)	პუსტიმილის ტიპი	მცენარეთა დასვის საშუალება	13ვეტარზე საჭირო პრაქტიკის რაოდენობა
კვირტების გაშლა	ლაქიანობა, ბაქტერიული დაავადებები და სხვ.	ფუნგიციდი	ირთკო*	4 კგ
	ნაცარი	ფუნგიციდი	სულფოლაკი*	4 კგ
	მწუნე და მღრღნელი მავნებლები	ინსექტიციდი	დევის* ფლუქსი	0,7-1,0 ლ
ნაყოფების გამოჩენა	ლაქიანობა, ბაქტერიული დაავადებები და სხვ.	ფუნგიციდი	ირთკო*	4 კგ
	ნაცარი	ფუნგიციდი	სულფოლაკი*	4 კგ
	თხილის კვირტის ტკიპა	ინსექტო-აკარიციდი	ობერონ* რაპიდი	0,6-0,8 ლ
ნაყოფების ფორმირება	მწუნე და მღრღნელი მავნებლები	ინსექტიციდი	სიტრინი*	0,3 ლ
	ნაცარი, ნაყოფების სიღამლეები	ფუნგიციდი	ზატო* სტარი	0,5 ლ
ნაყოფების მრდა, გულის ფორმირება	მავნებლები მ.შ. აზიური ფართსანა	ინსექტიციდი	დევის* ფლუქსი	0,7-1,0 ლ
	ნაცარი, ნაყოფის სიღამლეები	ფუნგიციდი	ზატო* სტარი	0,5 ლ
	ხარბაბუა, ცხვირგრძელა, ბუგრები, აზიური ფართსანა და სხვ.	ინსექტიციდი	სიტრინი*	0,3 ლ
ნაჭუქის ფერის შეცვლა	ტკიპები	აკარიციდი	ტინა*	0,8-1,0 ლ
	ნაცარი და სხვ.	ფუნგიციდი	ნატივო*	0,25-0,3 კგ
მოსავლის აღებამდე 20-25 დღით ადრე	მავნებლები, მ.შ. აზიური ფართსანა	ინსექტიციდი	სიტრინი*	0,3 ლ
	სიღამლეები	ფუნგიციდი	სკალა*	1,0 ლ
მოსავლის აღებამდე 10 დღით ადრე	მავნებლები მ.შ. აზიური ფართსანა	ინსექტიციდი	დევის* ფლუქსი	1,0 ლ
	მავნებლები მ.შ. აზიური ფართსანა	ინსექტიციდი	დევის* ფლუქსი	1,0 ლ
მოსავლის აღების შემდეგ	დაავადებების კომპლექსი	ფუნგიციდი	ირთკო*	4 კგ
	მავნებლების კომპლექსი	ინსექტიციდი	დევის* ფლუქსი	0,7-1,0 ლ
ფოთლდგენის დაშთავრებისას	მავნებლების მზამთრე სტადიები	ინსექტილი	ქვი*	15 ლ
		ინსექტიციდი	პირიფოსი*	1,5-2,0 ლ
ნორტი ამონაყვრები		ჰერბიციდი	ბასტა*	1 ლ პრეპარატი 100-150 ლ წყალში

შენიშვნა: მოცემული სქემა წარმოადგენს რეკომენდაციას და ამინდის პირობებიდან გამომდინარე შესაძლოა შეიცვალოს, კერძოდ გადანაცვლდეს წამლობების თანმიმდევრობა, გაიზარდოს ან შემცირდეს ჯერადობა!

